

**Gebrauchsinformation: Information für Anwender****Panthenol-Lösung Lichtenstein**

5 %, Lösung zur Anwendung auf der Haut

Wirkstoff: Dexpanthenol

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
- Wenn Sie sich nach 1 Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

**Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Panthenol-Lösung Lichtenstein und wofür wird sie angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Panthenol-Lösung Lichtenstein beachten?
3. Wie ist Panthenol-Lösung Lichtenstein anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Panthenol-Lösung Lichtenstein aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

**1. Was ist Panthenol-Lösung Lichtenstein und wofür wird sie angewendet?**

Panthenol-Lösung Lichtenstein ist ein Mittel zur Wundbehandlung. Sie wird angewendet zur Unterstützung der Heilung von Haut- und Schleimhautschädigungen.

**2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Panthenol-Lösung Lichtenstein beachten?****Panthenol-Lösung Lichtenstein darf nicht angewendet werden,**

wenn Sie allergisch gegen Dexpanthenol, Methyl(4-hydroxybenzoat), Propyl(4-hydroxybenzoat) (Parabene), Natriumbenzoat oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

**Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen.

**Kinder und ältere Menschen**

Es gibt keine Anwendungsbeschränkungen für Kinder und ältere Menschen.

**Anwendung von Panthenol-Lösung Lichtenstein zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind bei bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht bekannt.

**Schwangerschaft und Stillzeit**

Da nicht bekannt ist, wie viel Dexpanthenol durch die Haut in den Blutkreislauf aufgenommen wird, sollte bei einer großflächigen Anwendung von Panthenol-Lösung Lichtenstein während der Schwangerschaft und Stillzeit der Nutzen der Anwendung sorgfältig gegen ein mögliches Risiko abgewogen werden.

**Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

**Panthenol-Lösung Lichtenstein enthält Natriumbenzoat.**

Natriumbenzoat kann leichte Reizungen an Haut, Augen und Schleimhäuten hervorrufen.

**3. Wie ist Panthenol-Lösung Lichtenstein anzuwenden?**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache an. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

**Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:**

Tragen Sie Panthenol-Lösung Lichtenstein ein- bis mehrmals täglich unverdünnt auf die betroffenen Stellen auf. Die 500-ml-Lösung zur Anwendung auf der Haut kann auch unverdünnt in Form von Spülungen oder Umschlägen angewendet werden.

**Dauer der Anwendung**

Die Dauer der Behandlung richtet sich nach Art und Verlauf der Erkrankung.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

**Mögliche Nebenwirkungen**

Selten (betrifft 1 bis 10 Behandelte von 10.000):

Es können Unverträglichkeitsreaktionen (z. B. allergische Hautreaktionen) auftreten.

**Andere mögliche Nebenwirkungen**

Methyl(4-hydroxybenzoat) und Propyl(4-hydroxybenzoat) bzw. Natriumbenzoat können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch Spätreaktionen, hervorrufen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.

**5. Wie ist Panthenol-Lösung Lichtenstein aufzubewahren?**

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel und auf dem Behältnis nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

**Hinweis auf Haltbarkeit nach Anbruch**

Originalpackung mit 50 ml: Nach Anbruch der Flasche ist Panthenol-Lösung Lichtenstein 8 Wochen haltbar.

Originalpackung mit 500 ml: Nach Anbruch der Flasche ist Panthenol-Lösung Lichtenstein 12 Wochen haltbar.

## **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

### **Was Panthenol-Lösung Lichtenstein enthält**

Der Wirkstoff ist Dexpanthenol.

100 ml Lösung enthalten 5 g Dexpanthenol.

Die sonstigen Bestandteile sind: Natriumbenzoat, Methyl(4-hydroxybenzoat), Propyl(4-hydroxybenzoat), Ethanol 96 %, gereinigtes Wasser, 10%ige Salzsäure zur pH-Wert-Einstellung.

### **Wie Panthenol-Lösung Lichtenstein aussieht und Inhalt der Packung**

Panthenol-Lösung Lichtenstein ist eine klare und farblose Lösung, die in Braunglasflaschen zu 50 bzw. 500 ml abgefüllt wird.

Die 50-ml-Flaschen werden zur tropfenweisen Applikation mit einem Tropfeinsatz aus farblosem Polyethylen und einem Schraubverschluss aus weißem Polyethylen versehen. Die 500-ml-Flasche wird mit einer farblosen Ausgießhilfe aus Polyethylen und mit einem Schraubverschluss aus weißem Polyethylen versehen.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

#### **Winthrop Arzneimittel GmbH**

65927 Frankfurt am Main

Telefon: (01 80) 2 02 00 10\*

Telefax: (01 80) 2 02 00 11\*

#### **Mitvertrieb**

Zentiva Pharma GmbH

65927 Frankfurt am Main

Alternativer Hersteller:

Amcapharm Pharmaceutical GmbH, Industriestraße 10–12, 61191 Rosbach

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im **Februar 2013**.

---

### **Apothekenpflichtig.**

\*0,06 €/Anruf (dt. Festnetz); max. 0,42 €/min (Mobilfunk).