



schülke ->

Sanftes und wirksames Antiseptikum bei bakteriell bedingten Vaginalinfektionen

octenisept® Vaginaltherapeutikum

Unser Plus

- Wirksam gegen ein breites Erregerspektrum (Quelle 1,2)
- Mit dem eigens entwickelten Vaginalapplikator kann die Lösung einfach und diskret eingebracht werden
- Die gute Verträglichkeit wurde in klinischen Studien belegt - Schwangere ab dem 4. Schwangerschaftsmonat können das Produkt anwenden (Quelle 1-4)
- Durch die einfache Mitbehandlung des Partners kann das Risiko einer erneuten Infektion verringert werden
- octenisept® Vaginaltherapeutikum ist farblos - keine unangenehmen Flecken in der Wäsche

Bei Persistenz der Symptome und Rezidiven ist eine gynäkologische Untersuchung inkl. mikrobiologischer Diagnostik und ggf. antibiotischer bzw. antimykotischer Therapie erforderlich

Anwendungsgebiete

Zur Linderung der Symptomatik bei bakteriell bedingtem Juckreiz, Brennen und Ausfluss im Vaginalbereich

Anwendungshinweise

Dank des eigens entwickelten Applikators kann das octenisept® Vaginaltherapeutikum einfach und diskret angewendet und die Scheidenwand optimal benetzt werden.

1. durchsichtige Schutzkappe und Sprühkopf entfernen und sicher verwahren, stattdessen den Applikator aufsetzen
2. vor der Anwendung mehrere Pumphübe durchführen bis die Flüssigkeit aus dem Applikator tritt - das Sprühen kann aus jedem Winkel (auch über Kopf) erfolgen.
3. den Applikator auf der Toilette sitzend oder im Bettliegend tief in die Scheide einführen - 10 Pumphübe
4. nach der Anwendung den Applikator abwischen und nach unten gerichtet noch einmal aussprühen

Vor erneuter Anwendung ist mit nach unten gerichtetem Applikator ein- bis zweimal anzusprühen.

Die Behandlungsdauer beträgt sieben Tage.

Zur Vorbeugung einer erneuten Infektion sollte der Partner mit in die Behandlung einbezogen werden. Hierzu ist das Präparat ohne Applikator mit aufgesetzter Sprühkappe auf das männliche Genital bis zur vollständigen Benetzung aufzusprühen.



octenisept® Vaginaltherapeutikum

Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 0,1 g Octenidindihydrochlorid, 2,0 g Phenoxyethanol (Ph.Eur.)

Sonstige Bestandteile: (3-Cocosfettsäureamidopropyl)-dimethylazaniumylacetat, Natrium-D-gluconat, Glycerol 85 %, Natriumchlorid, Natriumhydroxid, gereinigtes Wasser

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,005 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	nicht anwendbar
Form	flüssig
pH	ca. 6 / 20 °C / Konzentrat

Besondere Hinweise

- octenisept® Vaginaltherapeutikum nicht in größeren Mengen verschlucken oder in größeren Mengen in den Blutkreislauf, z. B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen.
- Bei Anwendung von octenisept® Vaginaltherapeutikum kann als subjektiv empfundenen Symptom in seltenen Fällen ein vorübergehendes Brennen auftreten.
- Nach Anbruch: Im Behältnis verbliebene Restlösung ist nach Abschluss der Behandlung zu verwerfen.
- octenisept® Vaginaltherapeutikum für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Anwendung bei Schwangeren (ab dem 4. Monat): Es ist medizinischer Standard, dass die Anwendung von Arzneimitteln nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen sollte.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
octenisept Vag. Therap. PGH 50 ml FL	5/Karton	70001035
octenisept Vag.therap. 50 ml FL	20/Karton	121441

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com

1

Novakov Mikić, A. und Stojic, S. (2015): Study results on the use of different therapies for the treatment of vaginitis in hospitalised pregnant women. Arch. Gynecol. Obstet., 292(2), 371-376

2

Novakov Mikić A. und Budakov, D. (2010): Comparison of local metronidazole and a local antiseptic in the treatment of bacterial vaginosis. Arch. Gynecol. Obstet., 282, 43-47

3

Briese, V., Neumann, G., Waldschläger, J., May, T.W., Siebert, J. und Gerber, B. (2010): Efficacy and tolerability of a local acting antiseptic agent in the treatment of vaginal dysbiosis during pregnancy. Arch. Gynecol. Obstet., 283, 585-590

4

Friese, K., Neumann, G., Siebert, J., Harke, H.-P. und Kirschner, W. (2000): Vergleich zweier lokaler Antiseptika in der klinischen Anwendung bei bakteriell bedingten Vaginalinfektionen. Geburtsh. Frauenheilk., 60, 308-313

octenisept® Vaginaltherapeutikum

Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidindihydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph.Eur.).

- **Anwendungsgebiete:** Antiseptikum zur Behandlung von Vaginalinfektionen.

Linderung der Symptomatik bei bakteriell bedingtem Juckreiz, Brennen und Ausfluss

im Vaginalbereich. - **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

octenisept® Vaginaltherapeutikum nicht in größeren Mengen verschlucken oder in größeren Mengen in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt

oder Apotheker!

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller: Schülke & Mayr GmbH, D-22840

Norderstedt, Tel. +49 40 52100-0, info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com